

Pismeni ispit iz Numeričke matematike

Zadatak 1. [20 bodova]

- (a) *S kojom točnošću moramo znati vrijednosti nezavisnih varijabli*

$$x^* = 3.4812, \quad y^* = -5.0162, \quad z^* = -5.2003,$$

da absolutna pogreška funkcije $f(x, y, z) = \ln \frac{\sqrt{(x-2y)^3}}{y-e^z}$ ne premaši $\Delta f^ = 0.005$?*

- (b) *Za koliko znamenki u varijabli y možemo reći da je signifikantno?*

Zadatak 2. [20 bodova]

Pronadite interpolacijski polinom koji interpolira funkciju $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x - 1/2| - 1$ u točkama koje su nultočke Čebiševljevog polinoma 4. stupnja.

Zadatak 3. [20 bodova]

- (a) *Jesu li funkcije $\varphi_1(x) = 1$, $\varphi_2(x) = x - 4$ i $\varphi_3(x) = |x - 4| - 1$ međusobno ortogonalne na intervalu $[2, 6]$?*

- (b) *Pronadite najbolju L_2 aproksimaciju funkcije $f(x) = |x - 3|^3$ na intervalu $[2, 6]$ na potprostoru određenom baznim funkcijama $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ i $\varphi_3(x)$.*

Zadatak 4. [20 bodova]

Primjenom Newtonove metode treba odrediti minimum funkcije $f: [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x - 2)^3 - \log_4 4x$. Provjerite da li funkcija ispunjava uvjete konvergencije. Ako zadovoljava, odredite početnu točku i sljedeće tri iteracije.

Zadatak 5. [20 bodova]

- (a) *Na koliko dijelova treba podijeliti interval $[3, 4]$, tako da primjenom generaliziranog Simpsonovog pravila dobijemo približnu vrijednost integrala $\int_3^4 \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2} - 1\right) - \frac{1}{1-\cos^2\left(\frac{x}{2}-1\right)} dx$ s točnošću $\epsilon = 0.05$?*

- (b) *Primjenom generaliziranog Simpsonovog pravila izračunajte približnu vrijednost integrala $\int_3^4 \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2} - 1\right) - \frac{1}{1-\cos^2\left(\frac{x}{2}-1\right)} dx$ s točnošću $\epsilon = 0.05$.*