

# Bertrandov paradoks

Zimska škola matematike

Predavači: Rebeka Čordaš i Nenad Šuvak

28. siječnja 2012.

- 1 Statistička definicija vjerojatnosti
- 2 Geometrijska vjerojatnost
- 3 Bertrand Arthur William Russell
- 4 Bertrandov paradoks
  - Prvi pristup
  - Drugi pristup
  - Treći pristup
- 5 Literatura

# Statistička definicija vjerojatnosti

## Primjer 1.

Ako je tenisač  $A$  pobijedio tenisača  $B$  u 9 od 11 susreta, njegova šansa za pobjedu u sljedećem susretu najčešće se prognozira kao  $9 : 2$ .

Princip primijenjen u ovom primjeru temelji se na mogućnosti nezavisnog ponavljanja uvijek istog pokusa (u ovom slučaju teniskog meča), a **stupanj vjerovanja** u pojavu događaja izražava se na temelju broja pojavljivanja i nepojavljivanja događaja prilikom svih ponavljanja.

Izražavanje stupnja vjerovanja u pojavu događaja moglo bi se numerički izraziti također stavljanjem u omjer dijela i cjeline tj. racionalnim brojem  $\frac{9}{11}$ .

## Definicija 1.

Pokus je ponavljen  $n$  puta. Ako se pri tome događaj  $A$  realizirao  $n_A$  puta, broj  $n_A$  zovemo **frekvencija događaja  $A$** . Broj

$$\frac{n_A}{n}$$

zovemo **relativna frekvencija događaja  $A$** .

Uočimo da je

$$0 \leq n_A \leq n$$

te da je

$$0 \leq \frac{n_A}{n} \leq 1.$$

## Napomena 1.


Iskustvo nas uči da se kod nezavisnog ponavljanja istog pokusa puno puta relativna frekvencija nekog događaja **stabilizira** oko nekog broja iz intervala  $[0, 1]$ .

To svojstvo zovemo **statistička stabilnost relativnih frekvencija**.

Ako pokus ima svojstvo statističke stabilnosti relativnih frekvencija, tada za **vjerojatnost događaja**  $A$  vezanog uz taj pokus uzimamo realan broj oko kojeg se grupiraju relativne frekvencije tog događaja i taj broj označavamo  $P(A)$ .

## Primjer 2.

Bacanje pravilno izrađene igraće kockice



**Slika:** Grafički prikaz rel. frek. pojavljivanja 1 i 6 za 100 bacanja igraće kockice.

# Geometrijska vjerojatnost I

## Geometrijska vjerojatnost na $\mathbb{R}$

### Definicija 2.

Neka je  $\Omega$  omeđen interval relanih brojeva i  $\lambda(\Omega)$  njegova duljina, te  $A$  podskup od  $\Omega$  duljine  $\lambda(A)$ . Vjerojatnost da slučajno odabrana točka iz intervala  $\Omega$  bude sadržana u njegovom podskupu  $A$  je kvocijent duljine od  $A$  i duljine od  $\Omega$ :

$$P(A) = \frac{\lambda(A)}{\lambda(\Omega)}.$$

## Geometrijska vjerojatnost na $\mathbb{R}^2$

### Definicija 3.

Ne je  $\Omega$  ograničen podskup ravnine i  $\lambda(\Omega)$  njegova površina, te  $A$  podskup od  $\Omega$  površine  $\lambda(A)$ . Vjerojatnost da slučajno odabrana točka iz  $\Omega$  bude sadržana u njegovom podskupu  $A$  je kvocijent površine od  $A$  i površine od  $\Omega$ :

$$P(A) = \frac{\lambda(A)}{\lambda(\Omega)}.$$

# Geometrijska vjerojatnost II

## Napomena 2.

Ako sa  $\lambda(\cdot)$  označimo mjeru nekog skupa (dakle duljinu u  $\mathbb{R}$ , površinu u  $\mathbb{R}^2$ , ...), vjerojatnost da slučajno odabrana točka iz  $\Omega$  bude sadržana u njegovom podskupu  $A$  geometrijskim pristupom definiramo kao kvocijent mjere skupa  $A$  i mjere skupa  $\Omega$ .

## Primjer 3.

Pomoću geometrijske definicije vjerojatnosti odredimo:

- a) kolika je vjerojatnost da slučajno odabrana točka na kružnici radijusa  $R$  padne na kružni luk određen vrhovima  $A$  i  $B$  tog kružnici upisanog jednakostraničnog trokuta? ( $P(A) = \frac{1}{3}$ )
- b) kolika je vjerojatnost da je slučajno odabrana točka u krugu radijusa  $R$  upravo središte  $S$  tog kruga? ( $P(B) = 0$ )
- c) kolika je vjerojatnost da slučajno odabrana točka u krugu radijusa  $R$  padne u jednakostraničan trokut upisan tom krugu? ( $P(C) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$ )



# Bertrand Arthur William Russell



(18.5.1872. - 2.2.1970.)

- engleski filozof, matematičar, logičar, povjesničar i društveni reformator
- studirao filozofiju i matematiku na Trinity Collegeu u Cambridgeu
- matematički prikaz filozofije - monumentalno djelo "Principia mathematica" (u suradnji s A. N. Whiteheadom)
- 1950. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost

# Bertrandov paradoks

## Formulacija problema


Kolika je vjerojatnost da duljina slučajno odabrane tetive kružnice bude veća od duljine tog kružnici upisanog jednakostraničnog trokuta?

## Uvedimo sljedeću oznaku

$A$  - duljina slučajno odabrane tetive kružnice veća je od duljine tog kružnici upisanog jednakostraničnog trokuta

# Bertrandov paradoks - prvi pristup

- dana je kružnica radijusa  $R$  sa središtem u točki  $S$
- izaberimo točku  $T$  na kružnici i upišimo jednakostraničan trokut  $\triangle TUV$  s vrhom u točki  $T$
- izaberemo drugu točku  $T'$  na kružnici i povucimo tetivu  $\overline{TT'}$



Prvi pristup - "slučajne krajnje točke tetive"


# Bertrandov paradoks - prvi pristup

- uočimo - tetiva  $\overline{TT'}$  dulja je od stranice kružnici upisanog jednakostraničnog trokuta ako i samo ako točka  $T'$  leži na kružnom luku određenom točkama  $U$  i  $V$
- duljina kružnog luka određenog točkama  $U$  i  $V$  jednaka trećini opsega kružnice  $\longrightarrow$

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

# Bertrandov paradoks - drugi pristup I

- dana je kružnica radijusa  $R$  sa središtem u točki  $S$
- izaberemo neki radijus kružnice i rotiramo trokut tako da je jedna njegova stranica okomita na izabrani radijus
- izaberemo točku na tom radijusu i konstruiramo tetivu čije je polovište odabrana točka



Drugi pristup - "slučajna udaljenost od središta kružnice"


# Bertrandov paradoks - drugi pristup

- uočimo - tetiva je dulja od stranice kružnici upisanog jednakostraničnog trokuta ako i samo ako je udaljenost tetive od središta kružnice manja od polovice radijusa  $R$
- slijedi da je tražena vjerojatnost  $\longrightarrow$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

# Bertrandov paradoks - treći pristup

- dan je krug radijusa  $R$  sa središtem u točki  $S$
- izaberemo bilo koju točku unutar kruga i konstruiramo tetivu kojoj je odabrana točka polovište



Treći pristup - "slučajno odabrano polovište tetive"

# Bertrandov paradoks - treći pristup

- uočimo - tetiva je dulja od stranice krugu upisanog jednakostraničnog trokuta ako i samo ako njezino polovište leži u tom trokutu upisanom krugu
- radijus jednakostraničnom trokutu opisane kružnice -  $R$ ; radijus jednakostraničnom trokutu upisane kružnice -  $\frac{R}{2}$
- površina kruga omeđenog upisanom kružnicom - četvrtina površine zadanog kruga  $\longrightarrow$

$$P(A) = \frac{1}{4}$$



# Bertrandov paradoks - kratka analiza

- za isti problem dobili smo tri različita rješenja - niti u jednom pristupu ne možemo naći pogrešku
- rješenje Bertrandovog problema ovisi o metodi slučajnog odabira tetive zadane kružnice - budući ne postoji jedinstvena metoda slučajnog odabira tetive, niti rješenje nije jedinstveno
- bez dodatnih informacija o metodi slučajnog odabira tetive nemamo razloga preferirati niti jedno od tri dobivena rješenja
- **jednoznačno zadana metoda slučajnog odabira tetive** ⇒ **jedinstveno rješenje Bertrandovog problema**

# Literatura

- ① N. Sarapa, *Kombinatorika, vjerojatnost i statistika*, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
- ② I. Plavčić, T. Škrtić i D. Pavrlišak, *Matematički paradoksi*, math.e, br. 16
- ③ Wikipedia, Bertrandov paradoks
- ④ Wikipedia, Bertrand Arthur William Russell